

J'ai des symptômes
(fièvre, toux,
courbatures, ...)

Je m'isole,
je reste chez moi



Test PCR ou antigénique immédiat



Si les symptômes s'aggravent :
contactez immédiatement votre
médecin traitant ou le 15

Statut vaccinal

Je suis
CAS CONTACT**

Je suis
POSITIF

✓ Schéma vaccinal
COMPLET ou
infection Covid de
moins de 4 mois

- Test (par PCR, test antigénique ou autotest)
à J+2

➤ Si test antigénique et autotest positif :
nécessaire de confirmer par un test PCR puis
suivi des consignes si positif confirmé.

Si test négatif : **pas d'isolement, je continue
d'aller en cours port du masque 7 jours après le
dernier contact avec le cas positif**

Consignes valables pour les personnes vivant en dehors et au sein du foyer du cas positif

- **Isolement de 7 jours** à partir du test positif ou des
symptômes s'il y en a
- L'Assurance Maladie vous contactera par SMS
ou téléphone pour vous donner les consignes
sanitaires
- j'informe ma faculté de la situation

➤ Isolement levé au bout de 5 jours si test PCR ou
antigénique négatif le 5ème jour et en l'absence
de symptômes depuis 48h

- **Isolement de 10 jours** à partir du test positif ou des
symptômes s'il y en a
- L'Assurance Maladie vous contactera par SMS
ou téléphone pour vous donner les consignes
sanitaires
- j'informe ma faculté de la situation

➤ Isolement levé au bout de 7 jours si test PCR ou
antigénique négatif le 7ème jour et en l'absence
de symptômes depuis 48h

✗ SANS vaccination
ou Schéma vaccinal
INCOMPLET ou
Covid de plus de 4 mois

** Est considérée comme cas contact toute personne : Ayant partagé le même lieu de vie qu'un cas confirmé / Ayant été en contact direct avec un cas : face à face, moins d'un mètre, quelle que soit la durée (conversation, flirt, accolade, embrassade) / Ayant prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soin / Ayant partagé un espace confiné (bureau, salle de réunion, véhicule personnel...) pendant au moins 15 min avec un cas, ou face à face avec un cas pendant épisode de toux ou d'éternuement / Etudiant ou enseignant du même groupe de TD/TP
EN L'ABSENCE DE MESURES BARRIERES EFFICACES DURANT LA DUREE DU CONTACT (plexi, masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas OU le contact, masque tissu porté par le cas ET le contact).