

J'ai des symptômes  
(fièvre, toux,  
courbatures, ... )

Je m'isole,  
je reste chez moi



Test PCR ou antigénique immédiat



Si les symptômes s'aggravent :  
contactez immédiatement votre  
médecin traitant ou le 15

## Statut vaccinal



**Schéma vaccinal  
COMPLET** ou  
infection Covid de  
moins de 2 mois



**SANS vaccination**  
ou Schéma vaccinal  
INCOMPLET ou  
Covid de plus de 2 mois

Je suis  
**CAS CONTACT\*\***

- Test (par PCR, test antigénique ou autotest)  
à J+2
- Si test antigénique et autotest positif :  
nécessaire de confirmer par un test PCR puis  
**suivi des consignes si positif confirmé.**

Si test négatif : **pas d'isolement, je continue  
d'aller en cours port du masque 7 jours après le  
dernier contact avec le cas positif**

Consignes valables pour les personnes vivant en dehors et au sein du foyer du cas positif

Je suis  
**POSITIF**

- **Isolement de 7 jours** à partir du test positif ou des  
symptômes s'il y en a
  - l'Assurance Maladie vous contactera par SMS  
ou téléphone pour vous donner les consignes  
sanitaires
  - j'informe ma faculté de la situation
  - **Isolement levé au bout de 5 jours** si test PCR ou  
antigénique négatif le 5ème jour et en l'absence  
de symptômes depuis 48h
- 
- **Isolement de 10 jours** à partir du test positif ou des  
symptômes s'il y en a
  - l'Assurance Maladie vous contactera par SMS  
ou téléphone pour vous donner les consignes  
sanitaires
  - j'informe ma faculté de la situation
  - **Isolement levé au bout de 7 jours** si test PCR ou  
antigénique négatif le 7ème jour et en l'absence  
de symptômes depuis 48h

\*\* Est considérée comme cas contact toute personne : Ayant partagé le même lieu de vie qu'un cas confirmé / Ayant été en contact direct avec un cas : face à face, moins d'un mètre, quelle que soit la durée (conversation, flirt, accolade, embrassade) / Ayant prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soin / Ayant partagé un espace confiné (bureau, salle de réunion, véhicule personnel...) pendant au moins 15 min avec un cas, ou face à face avec un cas pendant épisode de toux ou d'éternuement / Etudiant ou enseignant du même groupe de TD/TP  
EN L'ABSENCE DE MESURES BARRIERES EFFICACES DURANT LA DUREE DU CONTACT (plexi, masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas OU le contact, masque tissu porté par le cas ET le contact).